

SKÓRY SUROWE	NORMA BRANŻOWA	BN-68
	Skóry surowe zwierząt futerkowych Skóry kotów	7713-05
		Grupa katalogowa 1585

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są skóry surowe z kotów domowych.

1.2. Symbol skóry surowej z kota: Kd.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Kategorie okrywy włosowej i mizdry. W zależności od jakości okrywy włosowej i mizdry różni się w każdym rodzaju trzy kategorie, oznaczone cyframi arabskimi: 1, 2, 3.

2.2. Kategorie wad. W zależności od natężenia wad różni się w poszczególnych kategoriach okrywy włosowej i mizdry trzy kategorie wad, oznaczone literami: A, B, C.

2.3. Klasy skór. W zależności od kategorii okrywy włosowej i mizdry oraz kategorii wad zalicza się skóry do czterech klas, oznaczonych cyframi rzymskimi: I, II, III, IV.

2.4. Rodzaje. W zależności od umaszczenia (barwy okrywy włosowej) różni się następujące rodzaje skór:

- Kdc - czarne,
- Kdt - tygrysie,
- Kdl - łaciate.

2.5. Przykład oznaczenia skóry surowej z kota tygryziej drugiej kategorii okrywy włosowej i mizdry, kategorii wad B, klasy trzeciej:

Kdt-2B III BN

3. WYMAGANIA

3.1. Zdjęcie skóry. Skóra powinna być zdjęta systemem workowym z pozostawieniem przy niej skóry z głowy i łap do stawu skokowego i nadgarstkowego i skóry z ogona. Na skórze nie powinno być resztek mięśni, ścięgien, tłuszczu i skrzepów krwi. Skóra powinna być wysuszona i odwrócona włosiem na zewnątrz.

3.2. Kategorie okrywy włosowej i mizdry oraz kategorie wad

Kategorie okrywy włosowej i mizdry	Cechy	Kategorie wad		
		A	B	C
1	okrywa włosowa zimowa w pełni dojrzała, mizdra bez sinych plam, podszycie na stronie grzbietowej i brzusznej gęste, włosy pokrywowe dobrze wykształcone; dopuszcza się niewielkie plamy na mizdrze na podbródku, łapach i podbrzuszu	1A	1B	1C
2	okrywa włosowa dojrzała, podszycie na stronie grzbietowej i brzusznej średnio gęste, włosy pokrywowe słabiej rozwinięte; dopuszcza się skóry - z mniej wykształconym włosiem pokrywowym na stronie brzusznej i bokach oraz z niską okrywą włosową na szyi - z plamami na mizdrze, na podgardlu oraz przy nasadzie ogona o powierzchni 4 cm ²	2A	2B	2C
3	okrywa włosowa niezupełnie dojrzała lub przejrzała, podszycie na stronie grzbietowej średnio gęste, na brzusznej rzadkie, włosy pokrywowe niewykształcone, niskie, mizdra zgrubiła z sinyimi plamami	3A	3B	3C
<p>Kategoria A oznacza tylko wady niepoliczalne i jedną wadę małą policzalną. Kategoria B oznacza wady niepoliczalne oraz policzalne 2 wady małe albo jedną wadę średnią. Kategoria C oznacza wady niepoliczalne oraz policzalne 4 wady małe lub 2 wady średnie albo jedną wadę dużą.</p>				

Skóry z wadami większymi niż dopuszczalne dla kategorii C lub mające okrywę włosową poniżej kategorii 3, nie dyskwalifikującą jeszcze skóry do celów futrzarskich, należy zaliczyć do klasy IV.

Centrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
 Ustanowiona przez Dyrektora CSWiS dnia 24 kwietnia 1968 r.
 jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1969 r.
 (Mon. Pol. nr 27/1968 poz. 185)

3.3. Wady skór

Lp.	Grupa wad	Wyszczególnienie
1	Niepoliczalne	a) rozdarcia i rozcięcia skóry niezależnie od miejsca występowania mające do 1 cm długości, jeżeli występują w liczbie nie większej niż 2 b) wszelkie uszkodzenia mizdry lub włosów o łącznej powierzchni do 1 cm ² c) zaplamienie okrywy włosowej krwią, rdzą, kałem o powierzchni do 4 cm ² d) wszelkie uszkodzenia skóry z głowy o łącznej powierzchni do 15 cm ² , całkowity brak kończyn e) brak skóry z ogona i uszu f) zakonserwowanie skóry włosem na zewnątrz
2	Policzalne małe	a) rozdarcia i rozcięcia o łącznej długości do 6 cm b) dziury i łysiny oraz wytarcia i wychwyty włosa o powierzchni 2÷9 cm ² c) zaplamienie okrywy włosowej (krwią, rdzą, moczem) o powierzchni 5÷15 cm ² d) skrzepy krwi, resztki mięśni i tłuszczu na mizdrze o powierzchni 6÷20 cm ² e) brak skóry głowy f) wyraźne poprzeczne lub podłużne pofałdowanie skóry g) rozcięcia skóry wzdłuż środkowej linii brzucha (rozcięcia symetryczne) h) przesunięcie symetrii osi grzbietu do 5 cm
3	Policzalne średnie	a) rozdarcia i rozcięcia o łącznej długości 7÷19 cm b) dziury, wytarcia, łysiny i wychwyty włosa o powierzchni 10÷19 cm ² c) lekkie sfilcowanie włosów do 10% powierzchni skóry d) zaplamienie okrywy włosowej (krwią, rdzą, moczem) o powierzchni 16÷20 cm ² e) zdjęcie skóry w stanie rozpostartym z niesymetrycznym rozcięciem wzdłuż linii brzucha f) skrzepy krwi, resztki mięśni i tłuszczu na mizdrze o powierzchni 21÷40 cm ² g) zniekształcenie skóry wskutek wypchania jej przy suszeniu słomą, papierem itp. h) występowanie pleśni w niewielkiej ilości
4	Policzalne duże	a) rozdarcia i rozcięcia o łącznej długości 20 ÷ 30 cm b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty włosów o powierzchni 20÷30 cm ² c) lekkie sfilcowanie włosów do 20% powierzchni skóry d) głębokie sfilcowanie włosów do 10% powierzchni skóry e) zaplamienie okrywy włosowej (krwią, rdzą, moczem) o powierzchni 31÷60 cm ² f) wyraźne występowanie pleśni g) skrzepy krwi, resztki mięśni i tłuszczu na mizdrze o powierzchni 41÷80 cm ² h) zrogowacenie skóry do 10% jej powierzchni

3.4. Klasy skór

Klasy skór	Kategorie okrywy włosowej i mizdry oraz kategorie wad
I	1, 1A
II	1B, 2, 2A
III	1C, 2B, 3, 3A
IV	2C, 3B, 3C

3.5. Charakterystyka rodzajów

Rodzaje	Charakterystyka barwy okrywy włosowej
Skóry czarne	barwa włosów na stronie grzbietowej jednolita, w kolorze czarnym lub czarnobrazowym; dopuszczalne występowanie na podbrzuszu jaśniejszych odcieni lub imiego ubarwienia niż na części grzbietowej
Skóry tygrysie	barwa włosów na stronie grzbietowej szarozielonkawa, w odcieniach jaśniejszych i ciemniejszych, z tym że na grzbiecie powinny występować symetrycznie ułożone pręgi lub punkty o ubarwieniu ciemniejszym od tła; dopuszcza się na podbrzuszu białe ubarwienie nie rozszerzające się na górną część szyi
Skóry łaciate	skóry nie odpowiadające wymaganiom stawianym skórom kotów czarnych i kotów tygrysów

4. BADANIA

4.1. Rodzaje badań. Każdą skórę należy poddać następującym badaniom:

- sprawdzenie rodzaju,
- sprawdzenie prawidłowości zdjęcia i konserwacji skóry,
- sprawdzenie okrywy włosowej i mizdry,
- wykrywanie wad.

4.2. Badania rozjemcze. W sprawach spornych co do zakwalifikowania skóry do danej klasy służy odwołanie do upoważnionego rzeczoznawcy, uzgodnionego przez obie strony, który wyda orzeczenie.

4.3. Opis badań

4.3.1. Sprawdzenie rodzaju, prawidłowości zdjęcia i konserwacji skóry oraz sprawdzenie okrywy włosowej i mizdry należy przeprowadzić przy pełnym równomiernym oświetleniu naturalnym (jednak nie bezpośrednio w słońcu) lub w świetle sztucznym zbliżonym do światła dziennego.

4.3.2. Wykrywanie wad należy przeprowadzić przez oględziny, dotyk i ewentualny pomiar wad na skórze, z następującymi warunkami:

- za powierzchnię uszkodzoną należy przyjąć powierzchnię prostokąta opisanego na tym uszkodzeniu, czyli powierzchnię wynikającą z pomnożenia największej szerokości przez największą długość uszkodzenia, mierzonych z dokładnością do 0,5 cm,
- jeżeli dwie lub więcej uszkodzonych powierzchni oddziela nieuszkodzona przestrzeń mniejsza niż 1 cm, powierzchnie te należy traktować jako jedną,
- w przypadku występowania na powierzchni uszkodzonej dwóch lub więcej różnych uszkodzeń należy liczyć tylko jedno najpoważniejsze uszkodzenie,
- przez głębokie sfilcowanie należy rozumieć splątanie włosów, które tworzą zbitą masę wyczuwalną przy dotyku,
- przecięcie symetryczne skóry wzdłuż środkowej linii strony brzusznej, za zgodą obu stron, nie powoduje obniżenia klasy skóry.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE