

| | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| SKÓRY SUROWE | N O R M A B R A N Ż O W A | BN-83 |
| | Skóry surowe zwierząt futerkowych Skóry królików hodowanych | 7713-12 |
| | | Zamiast BN-74/7713-12 |
| | | Grupa katalogowa 1585 |

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są skóry surowe królików hodowanych oznaczone symbolem Kr.

1.2. Zakres stosowania normy. Norma obowiązuje w zakresie obrotu.

1.3. Określenia — wg PN-80/P-22027.

2. PODZIAŁ

2.1. Rodzaje. W zależności od przeznaczenia okrywy włosowej rozróżnia się dwa rodzaje skór:

F — futerkowe,

X — filcowe (nie nadające się do celów futrzarskich).

2.2. Grupy barwne. W zależności od umieszczenia okrywy włosowej rozróżnia się dwie grupy skór:

b — białe,

k — kolorowe.

Charakterystykę barwy grup i odmian podano w Informacjach dodatkowych.

Podział na odmiany barwne stosowany jest na żądanie odbiorcy.

2.3. Kategorie okrywy włosowej i mizdry. W zależności od stanu jakości okrywy włosowej i mizdry rozróżnia się w każdej grupie barwnej skór futerkowych dwie kategorie oznaczone cyframi arabskimi 1 i 2.

2.4. Kategorie wad. W zależności od nasilenia wad rozróżnia się, w poszczególnych kategoriach okrywy włosowej i mizdry skór futerkowych, cztery kategorie wad oznaczone literami: A, B, C, D.

2.5. Klasy. W zależności od kategorii okrywy włosowej i mizdry oraz kategorii wad zalicza się skóry futerkowe do trzech klas oznaczonych cyframi rzymskimi: I, II, III. W zależności od jakości rozróżnia się dwie klasy skór filcowych oznaczone cyframi rzymskimi: I i II.

3. WYMAGANIA

3.1. Zdjęcie i konserwacja skóry. Skóra powinna być zdjęta systemem workowym, z odcięciem od niej skóry z głowy wraz z uszami. Skóry z kończyn przednich po-

winny być odcięte w stawie nadgarstkowym, z tylnych — w stawie skokowym. Dalsze postępowanie ze skórą — zgodnie z PN-74/P-22010. Powierzchnia skóry futerkowej nie może być mniejsza niż 600 cm²; dla skór filcowych nie określa się wymagań powierzchni.

3.2. Skóry surowe futerkowe

3.2.1. Kategorie okrywy włosowej i mizdry oraz kategorie wad — wg tabl. 1.

Tablica 1

| Kategoria okrywy włosowej i mizdry | Cechy | Kategorie wad | | | |
|---|--|---------------|----|----|----|
| | | A | B | C | D |
| zakwalifikowanie skór po uwzględnieniu wad wg 3.2.2 | | | | | |
| 1 | a) okrywa włosowa dojrzała b) podszycie na stronie grzbietowej średnio gęste c) włosy pokrywowe wykształcone d) dopuszczalne skóry: — z mniej wykształconym włosem pokrywowym na stronie brzusznej i bokach — z plamami na mizdrze podgardla oraz na stronie grzbietowej w częściach bocznych do 2 cm z każdej strony, łącznie do połowy długości skóry oraz przy nasadzie ogona o powierzchni do 4 cm ² | 1A | 1B | 1C | 1D |
| 2 | a) okrywa włosowa niezupełnie dojrzała lub przejrzała b) podszycie na stronie grzbietowej średnio gęste, a na brzusznej rzadkie | 2A | 2B | 2C | 2D |

Zgłoszona przez Instytut Zootechniki
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Zootechniki dnia 30 listopada 1983 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1984 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1984 poz. 6)

cd. tabl. 1

| Kategoria okrywy włosowej i mizdry | Cechy | Kategorie wad | | | |
|------------------------------------|--|---------------|----|----|----|
| | | A | B | C | D |
| 2 | c) włosy pokrywowe słabo rozwinięte z kępkowymi niedorostami lub przerostami d) mizdra z sinymi plamami | 2A | 2B | 2C | 2D |

Wymagania podane w tabl. 1 dla włosa pokrywowego nie dotyczą skór surowych królików Rexów.

Kategoria A dopuszcza tylko dwie wady małe.

Kategoria B dopuszcza do czterech wad małych albo do dwóch wad średnich lub jedną wadę dużą.

Kategoria C dopuszcza do ośmiu wad małych lub cztery wady średnie albo dwie wady duże.

Kategoria D dopuszcza wady w większej liczbie niż kategoria C oraz wady okrywy włosowej i mizdry poniżej kategorii drugiej.

3.2.2. Wady skór — wg tabl. 2.

Tablica 2

| Grupa wad | Wyszczególnienie |
|-----------|---|
| Małe | a) rozdarcia i rozcięcia skóry o łącznej długości od 3 do 6 cm b) dziury, łysiny, wytarcia i ubytki włosów o powierzchni łącznej od 2 do 6 cm ² c) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, kałem, rdzą i krwią) o powierzchni łącznej od 5 do 15 cm ² d) wycięcie skóry na podbrzuszu w kształcie trójkąta na długości od 4 do 6 cm e) wyraźne poprzeczne lub podłużne pofałdowanie skóry f) zdjęcie skóry w stanie rozpostartym z niesymetrycznym rozcięciem wzdłuż linii brzucha g) resztki mięśni, tłuszczu i skrzepów krwi na mizdrze w niewielkiej ilości h) pozostałe skóry z głowy wraz z uszami |
| Średnie | a) rozdarcia i rozcięcia o łącznej długości do 20 cm b) dziury, łysiny, wytarcia i ubytki włosów o powierzchni łącznej do 20 cm ² c) płytkie sfilcowanie włosów do 10% powierzchni skóry d) wycięcie skóry na podbrzuszu w kształcie trójkąta na długości ponad 6 cm e) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, kałem, rdzą, krwią) o powierzchni łącznej do 30 cm ² f) zakonserwowanie skór bez prawideł (skóry zniekształcone) |
| Duże | a) rozdarcia i rozcięcia o łącznej długości do 25 cm b) dziury, łysiny, wytarcia i ubytki włosów o powierzchni do 30 cm ² c) płytkie sfilcowanie włosów do 20% powierzchni skóry d) głębokie sfilcowanie włosów do 10% powierzchni skóry e) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, kałem, rdzą, krwią) o powierzchni do 60 cm ² f) lekkie występowanie pleśni g) zrogowacenie skóry do 5% jej powierzchni h) resztki mięśni, tłuszczu i krwi na mizdrze w dużej ilości |

3.2.3. Klasy skór — wg tabl. 3.

Tablica 3

| Klasy | Kategorie okrywy włosowej i mizdry oraz kategorie wad |
|-------|---|
| I | 1, 1A, 1B, |
| II | 2, 2A, 2B, 1C |
| III | 2C, 1D, 2D |

3.3. Skóry filcowe — wg tabl. 4.

Tablica 4

| Klasa I | Klasa II |
|---|--|
| Skóry nie nadające się do celów futrzarskich, prawidłowo zakonserwowane, o płytkim sfilcowaniu zajmującym do 25% powierzchni skóry lub głębokim sfilcowaniu zajmującym do 15% powierzchni oraz skóry o powierzchni mniejszej niż 600 cm ² , a skóry królików angorskich o długości odrostu włosów co najmniej 2 cm | Skóry wadliwie zakonserwowane oraz nie odpowiadające wymaganiom I klasy jakości skór filcowych oraz skóry uszkodzone przez szkodniki |

Skór skręconych, zwiniętych, zrogowaciałych w stopniu uniemożliwiającym ocenę, o głębokim sfilcowaniu zajmującym więcej niż 15% powierzchni skóry oraz bardzo uszkodzonych przez szkodniki nie zalicza się do skór filcowych.

4. ZNAKOWANIE, MAGAZYNOWANIE, PAKOWANIE I TRANSPORT

Znakowanie, magazynowanie, pakowanie i transport — wg PN-83/P-22029.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań. Każdą skórę należy poddać następującym badaniom:

- sprawdzenie rodzaju grup kolorystycznych,
- sprawdzenie prawidłowości zdjęcia i konserwacji skóry,
- sprawdzenie okrywy włosowej i mizdry,
- określenie wad.

5.2. Opis badań

5.2.1. Sprawdzenie rodzaju i odmiany, prawidłowości zdjęcia i konserwacji skóry, okrywy włosowej i mizdry należy przeprowadzić przez gładziny przy równomiernym oświetleniu.

5.2.2. Pomiar powierzchni skóry. Powierzchnię skóry ustala się przez pomnożenie jej długości przez średnią szerokość mierzoną pośrodku długości skóry, przy czym uzyskaną powierzchnię płaszczyzny grzbietowej mnoży się przez 2. Przy skórach rozpostartych nie wykonuje się mnożenia.

5.2.3. Wykrywanie wad. Należy przeprowadzić przez oględziny, dotyk i ewentualny pomiar wad na skórze wg PN-80/P-22027, z zachowaniem następujących warunków:

a) za powierzchnię uszkodzoną przyjąć powierzchnię prostokąta opisanego na uszkodzeniu z dokładnością do 0,5 cm,

b) jeżeli dwie lub więcej uszkodzonych powierzchni oddziela nie uszkodzona przestrzeń mniejsza niż 1 cm, powierzchnie te należy traktować jako jedną.

5.3. Ocena badań. Skórę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli badania wykonane wg 5.2 dadzą wyniki zgodne z wymaganiami rozdz. 3.

5.4. Badania rozjemcze. W sprawach spornych dotyczących zakwalifikowania skóry do danej klasy należy odwołać się do urzędowego rzeczoznawcy wyznaczonego przez producenta i odbiorcę.

6. POSTĘPOWANIE ZE SKÓRAMI NIEZGODNYMI Z WYMAGANIAMI NORMY

Skóry królicze futerkowe i filcowe nie spełniające wymagań określonych w normie pozostają w dyspozycji dostawcy.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Zootechniki, Kraków.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/7713-12

a) w części „Podział i oznaczenia” zlikwidowano „Oznaczenia”, jako nie mające zastosowania,

b) w części „Podział” wprowadzono charakterystykę grup i odmian barwnych umieszczając je w „Informacjach dodatkowych”,

c) zlikwidowano grupę wad niepoliczalnych, jako nie mającą istotnego wpływu na ocenę skór; przy wadach: małych, średnich i dużych zlikwidowano przymiotnik policzalny; w grupie wad małych wprowadzono dolne granice pomiaru wad,

d) korzystając z PN-80/P-22027 w części „Badania” skreślono w 4.3.3 cztery ostatnie pozycje c), d), e), f), których treść jest zawarta w ww. normie.

3. Normy związane

PN-74/P-22010 Skóry surowe zwierząt futerkowych. Konserwacja metodą suszenia

PN-80/P-22027 Skóry surowe futrzarskie. Nazwy i określenia

PN-83/P-22029 Skóry surowe zwierząt futerkowych. Znakowanie, magazynowanie, pakowanie i transport

4. Symbol wg SWW — 4253-2.

5. Autorzy projektu normy — mgr inż. Roman Kopański — Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Dep. Prod. Zwierzęcej, mgr inż. Halina Nowak-Nowicka — Instytut Zootechniki, Kraków.

6. Charakterystyka grup i odmian barwnych — wg tablicy.

| Grupy barwne | Odmiany | Charakterystyka barwy okrywy włosowej | Symbol |
|--------------|---------|--|--------|
| Skóry białe | białe | na całej powierzchni skóry jednolicie biała bez cętek i nalotów barwobcych | b |

cd. tablicy

| Grupy barwne | Odmiany | Charakterystyka barwy okrywy włosowej | Symbol |
|----------------|------------------|--|--------|
| Skóry kolorowe | zajęczate | brunatnoszara, brązowoszara, żelazistoszara i ciemnoszara (kangurowata), stopniowo rozjaśniająca się na bokach, aż do brudnobiałej na podbrzuszu | kz |
| | szynszylowate | srebrzystoszara z ciemniejszym woalem na grzbiecie, stopniowo rozjaśniająca się na bokach, aż do białej na podbrzuszu | ks |
| | czerwone | rdzawożółta, jaśniejsza na podbrzuszu | kc |
| | niebieskie | jednolicie ciemnostalowa z niebieskim odcieniem, jaśniejsza na podgardlu i podbrzuszu | kn |
| | srebrzyste | srebrzysta o typie ciemnym oraz jasnym | kt |
| | czarne | czystoczarna do grafitowoczarnej | kw |
| | czarne podpalane | na grzbiecie i bokach lśniącoczarna, a na podbrzuszu pomarańczoworuda | kp |
| | plamiste | na białym tle oznaki barwne czarne, zajęczate lub inne w kształcie pręgi wzdłuż grzbietu oraz plam owalnych na bokach i podbrzuszu | kl |
| | różne | inne | kż |